



內郵資已付  
高雄郵局許可證  
高雄免字第425號

退件請退回  
板橋國慶郵局



第2316期 2023.06.19~06.25

# 藥師週刊

《每逢週一發行》  
1960.4.30創刊

發行人/黃金舜 社長/蕭輔元 總編輯/許嘉紋 執行秘書/劉瑞耀 記者/蔡秋鳳  
發行所：中華民國藥師公會全國聯合會 社址：104台北市市民權東路一段67號5樓  
投稿e-mail：pharmist@taiwan-pharma.org.tw 網址：http://www.taiwan-pharma.org.tw  
電話：(02)2595-3856 傳真：(02)2599-1052 承印：益響實業有限公司(02)2389-0021  
版權所有·本刊圖文非經同意不得轉載 行政院新聞局局版北市誌第323號 中華郵政北台字第888號執照登記為雜誌文寄

- 重點推薦** 2版 藥師中藥執業交流研討會 台北場開訓
- 3版 巴比妥非原罪 「是藥」「是毒」在於有無專業
- 4版 食藥署西藥供應資訊平台 整合缺藥訊息

## 新北市幼兒園餵藥案延燒

# 全聯會籲避免臆測傷害醫療人員



↑藥師公會全聯會於6月13日對外發布新聞稿，呼籲主管單位盡速徹查幼兒園使用藥物來源，避免外界臆測傷害醫療人員。

【本刊訊】近期傳出新北市某幼兒園，幼兒疑遭教保員餵食管制藥物事件，消息一出引發社會譁然。藥師公會全聯會譴責相關不法事件，巴比妥類的藥物，在國內屬於管制藥品，即便是含有巴比妥的複方藥物，也必須有醫師開立的處方箋，才能到藥局領藥。

藥師公會全聯會副發言人王明媛接受媒體採訪時表示，若非家長親自帶小朋友就醫所開立的

藥品，園方沒有醫事人員不可以隨便給藥，尤其巴比妥屬於處方藥，到底從何管道取得，恐已違反醫師法、藥事法。

藥師公會全聯會於6月13日對外發布新聞稿，呼籲主管單位進行藥物溯源，盡速找出幼稚園使用藥物來源，避免外界過度臆測，造成社會恐慌與傷害第一線醫療人員。並說明巴比妥酸鹽類(Barbiturates)為一藥物類別，並非指向單一藥物品項，苯巴比妥(Phenobarbital)、西可巴比妥(Secobarbital Sodium)、異戊巴比妥(Amobarbital Sodium)、戊巴比妥(Pentobarbital Sodium)等都是其中成員。巴比妥類可抑制腦幹細胞與基底神經節，也可抑制中樞神經系統傳導，主要具有鎮靜、催眠、抗痙攣、治療癲癇作用，治療氣喘或過敏性疾使用麻黃鹼時，亦可併用巴比妥以抑制興奮作用。目前巴比妥相關藥物中，大多是使用苯巴比妥，其單方藥物屬管制藥品，以治療癲癇為主，110年度約有400萬筆醫令使用量，至於複方藥物，現存有有效藥證並排除不得製造者有9張，適應症涵蓋胃腸疾病、癲癇、呼吸道疾病，110年度約100萬筆使用量。

民眾務必在醫師、藥師等專業人士指導下正確使用，一旦不當服用，對身體的損害經常是看不見卻長久存在的。尤其是管制藥品具有成癮性與濫用性，相較於一般藥物，政府在管制上也更為嚴謹，民眾萬不得私自拿取他人藥物服用。處方箋上印有藥品明細及成分，服藥或自行購買藥物若有問題或疑惑，皆可諮詢藥局藥師，全國八千多家專業社區藥局，隨時嚴陣以待為民服務。



## 台大新聞所「疫後社區藥局發展」專題報導

# 探討社區藥局與連鎖藥局的未來發展



↑藥師公會全聯會常務監事李懿軒(左)於6月6日接受台大新聞所學生劉騏璋訪問，協助完成「疫後社區藥局發展」畢業專題報導。

【本刊訊】藥品供應，藥局數量的發展對整體社會來說是正向的。對民眾而言，提升藥物可近性，藥師也深入社區，給民眾專業照護與信賴。

在大型連鎖藥局展店創新高之下，社區藥局要強化照護專業，創造不可替代的價值，而連鎖藥局的優勢在於店面大、據點多、藥品種類較多，藥妝店現在也很多藥師駐點，改成藥局型態，再結合其他零售商品來搶客，兩者看似競合關係，其市場

仍有部分差異。

小型社區藥局的優勢在於，可即時配合政府政策的執行，以ICOPE計畫為例，因社區藥局與周邊鄰里熟識，服務年長者的優勢就顯現出來，公益性不在話下，也希望更多社區藥局藥師一起投入照護的行列，另外行之有年的戒菸、長者藥事照護，相關課程全聯會也提供進修的課程，歡迎所有藥師加入，一同增進藥師的價值。

# 藥師中藥執業交流研討會 台北場開訓



↑藥師公會全聯會於6月4日召開藥師中藥執業交流研討會台北場。

◎文／藥師林堃成

112年度「提升藥師中藥專業知能藥師公會全聯會承接衛福部教育訓練」，為瞭解中藥執業業

師之執業問題及需求，提高藥師執行中藥(材)供應及調劑等藥事業務之服務品質，辦理北中南東四場次中藥交流研討會，首場於6月4日召開，特邀李維庭、郭惠玲、雷才萱、吳俞瑾等藥師就中藥販賣業、中藥廠、中醫院所中藥局、社區中西藥局等四場域，分享藥師執業內容及環境。

此次研討會出席學員約60名，全聯會常務監事李懿軒致詞肯定學員對中藥執業熱忱投入，講師講授內容多元精闢，會前彙整學員對中藥製劑(材)採購通

路、儲存、販售、設備成本、中藥局處方溝通、中藥實證以及法規等執業困境提出意見並於現場提問討論，會後反應受益豐碩。

透過交流研討，再加以後續「提升藥師中藥專業知能教育訓練」帶狀課程研習，並與「中藥實習指導教師培訓認證暨中藥實習場所遴選建置計畫」相互銜接，相信必能大幅強化藥師投入中藥執業，落實藥師中藥天職。

(本文作者為全聯會中藥發展委員會副主委)

# 南部七縣市聯誼 促進藥事合作與經驗交流



↑高雄市第一藥師公會於6月3、4日主辦「南部七縣市藥師公會幹部聯誼會」。

◎文／高雄記者許永佳

高雄市第一藥師公會於6月3、4日主辦「南部七縣市藥師公會幹部聯誼會」。此活動主要由高雄市第一、高雄市、台南市南瀛、台南市、屏東縣、澎湖縣、台東縣藥師公會定期舉辦，除了讓各公會間保持良好的溝通管道外，也促進藥學事務之合作機會與經驗交流。

這是新冠疫情解封以來的大

型交流活動，主辦單位高雄市第一藥師公會理事長劉亮君與理監事特別慎重籌備此活動行程，與會來賓除各縣市公會幹部外，高雄市衛生局長黃志中與科長蔡智仁親臨現場致意。

黃志中特別感謝這三年疫情期間，從口罩實名制、防疫酒精配送、快篩試劑實名制到口服抗病毒藥調配發送等措施，藥師皆

全力參與政府防疫政策，為防疫國家隊不可或缺的重要成員。藥師公會全聯會理事長黃金舜率領幹部出席，除感謝各藥師公會在防疫政策的推動，讓藥師角色發光發熱外，對於近日立委提案藥事法第102條文「被」修正案事件，特別感謝全國藥師們展現團結捍衛藥師專業的決心。

另外，今年亞洲藥學會

(FAPA)年會黃金舜成功爭取在台灣主辦權，10月24~28日共五天的亞洲藥學學術盛事將在台北國際會議中心盛大舉辦，報名活動已開始，各項籌備工作正緊鑼密鼓地進行中，理事長與幹部們呼籲台灣藥師要全力參與這次盛事，也鼓勵藥師們將防疫相關作為撰文投稿，展現台灣藥師們在防疫工作的卓越表現，藉此推銷台灣，擴展台灣在國際上的能見度。

會議的專題演講由劉亮君分享高雄市居家醫療現況與親自參與送藥到府業務之甘苦談。他強調藥師在居家醫療業務的角色，不應只在調劑給藥等基本作業，藥師專業能力需要提升，才能執行藥物諮詢業務或審視處方疑義或病人用藥反應評估。最後在交接儀式下圓滿結束，下次聯誼會活動將由台南市南瀛藥師公會接棒。

# 基宜花聯合參訪番路鄉 恭賀藥師之光



↑基隆、宜蘭、花蓮等三縣市藥師公會組團參訪番路鄉，並致贈藥師之光匾額給鄉長蕭博勝(前排中)。

◎文／花蓮縣記者趙瑞平

位於阿里山下的嘉義縣番路鄉在去(111)年的11月選舉中產生了一位藥師蕭博勝當選鄉長，他是原本在社區開設藥局的藥師，亦是藥師公會全聯會理事，也是嘉義縣藥師公會前理事長。

蕭博勝當選鄉長至今已有一年，熱情邀請各縣市藥師公會夥伴能

夠前去番路鄉參訪。在全聯會常務理事趙瑞平的促成下，基隆市理事長黃瓊瑜、宜蘭縣理事長楊永安、花蓮縣理事長林憶君等三縣市藥師公會幹部特別組團，在6月2日率領幹部一同前往番路鄉參訪。

當天蕭博勝特別率領公所主管在門口迎接，並進行簡報介紹番路鄉讓大家認識，透過這次的參訪希望全國的藥師能夠知道嘉義縣番路鄉，也能認識這位鄉長

就是藥師。

此次基隆、宜蘭、花蓮等三縣市藥師公會組團參訪實屬創舉，也受到新竹市、台南市南瀛、嘉義縣、嘉義市等藥師公會理事長及幹部的熱情接待，更加促進各友會的交流。希望大家能多多到番路鄉旅遊並多給鄉長加油打氣！



# 巴比妥非原罪 「是藥」「是毒」在於有無專業



↑單方巴比妥類藥物受到管制，每日藥師都需要盤點且定期回報。

◎文／藥師蘇柏名

「藥即是毒」是藥師常掛在嘴巴的一句話，這次在新北市幼兒園餵藥事件中，更是體現了在沒

有專業照護情況下，隨意使用藥物會造成多麼嚴重的後果。新北市幼兒園院方為了方便管理，竟然便宜行事，在沒有專業的指導下擅自給予幼童治療指數狹窄的巴比妥類藥物，造成部分幼童遭受因藥物副作用產生的痛苦，實在非常可惡。

藥物在沒有正確使用的情况下，對身體非但沒有治療的效果，反而如同毒藥一樣傷害身體，但是因為這樣子就污名化藥物或是追查來源的過程中影射某些基層醫療院所或藥局，實在不妥，那的確是非戰之罪。

## 屬管制藥品需追蹤流向

食藥署會繼續發給藥證，就表示在某些族群身上使用此藥物的好處是多過壞處的，所以此藥物確實有其存在的必要。雖然治

療指數狹窄，但是只要是經過對的人指導以及用對地方，巴比妥鹽仍然是良藥一帖。追查藥物的來源是為了還原真相並且避免更多無辜的幼童受害，相信不可能有任何醫療專業會罔顧孩童健康給予此藥物，而且單方巴比妥類藥物受到管制，每日藥師都需要盤點且定期回報，過度猜想或懷疑甚至以「抓戰犯」的心態看待只會無意間撕裂社會，更會使此類藥蒙上不明之冤。

## 專業把關 不需過度擔心其成癮性

以巴比妥類藥物來說，因為它可以抑制腦幹細胞及基底神經節，也可抑制中樞神經，除可鎮靜安眠，亦具有抗痙攣以及治療癲癇的效果，除單方使用外，也有些含苯巴比妥成分的複方藥物，像是「胃雅錠」、「胃可樂錠」以及「腸宜

錠」等腸胃道藥物，也有像是「喘咳寧錠」及「醫嗽寧錠」等等支氣管氣喘的藥物，就是仰賴巴比妥類藥品特性而能有效治療症狀的藥物，而且裡面Phenobarbital的劑量相對低，對身體的傷害較小，只要是經醫師開立、藥師調劑把關，民眾可以安心使用，也不需過度擔心其成癮性。

現在政府已經全面介入此次餵藥事件，家長需要注意的是家中寶貝是否有出現類似的副作用，例如頭暈、昏昏欲睡和言語不清等；或是出現藥物成癮停藥後的「戒斷症狀」，像是過度激動、睡眠困難甚至出現幻覺和發燒等嚴重症狀。Phenobarbital藥物半衰期約為70~140小時，如果有懷疑小朋友可能有接觸到此類藥物或是出現上述症狀，建議家長可以盡快送醫評估。

## 臺中市藥師公會與健保署座談會 討論缺藥議題



↑臺中市藥師公會理事長陳振聲於5月底帶領幹部，與中央健康保險署中區業務組舉辦業務座談會。

◎文／台中記者黃瑋嬪

馥舉辦業務座談會，討論缺藥、

健保核扣及藥事照護等相關問題。歷經疫情以來，缺藥種類及數量日益增多，民眾慣用藥品取得越來越困難，儼然成為不得不重視的問題。李純馥表示，將與衛生福利部、食藥署及醫院、藥商協調，期望將缺藥狀況降至最低。疫情期間社區藥局調劑抗病毒藥物，因未及時上傳等核扣事項，李純馥說明不會立即扣款，

會等問題釐清後或其他區都已執行，才會扣款。陳振聲提出今年會盡量配合多元藥事照護計畫，包含送藥到府、在地藥事服務、完善國內藥事照護及執業品質等。現在台中市面臨的問題，也是全台灣面臨的，更是全世界都需要面對的，相信臺中市藥師公會及健保署雙方代表經過本次良性互動，能激發出更多全民互惠的方案。

## 食藥署西藥供應資訊平台 整合缺藥訊息



↑西藥供應資訊平台操作畫面。

◎文／台南記者陳佳玲

缺藥問題演變至今，已造成醫療端的嚴重困擾，有鑑於此，

許可證，如有無法繼續製造、輸入或不足供應該藥品之虞時，應至少於6個月前向中央衛生主管機

關通報；如因天災或其他不應歸責於藥商之事由，而未及於前述期間內通報者，應於事件發生後30日內向中央衛生主管機關通報。除了藥商需通報外，一線醫療院所也可以上網主動通報，在「西藥供應資訊平台」的「通報系統 我要通報」入口，進去後可以使用不同單位類別（政府單位、醫院、診所藥局、藥廠/藥商、社區藥局等）進行通報，利用已受理案件編號及通報者E-mail於網站「案件查詢」查詢案件處理情形。此外，此平台亦有「建議使用替代藥品品項」、「無替代藥品品項」及「已恢復供應品項」供查

詢，「建議使用替代藥品品項」也提供替代品項及訂貨聯絡電話，便於利用。通報處理中心的聯絡窗口為社團法人臺灣臨床藥學會，若有疑問也可以向學會尋求協助。最後提醒，平台公告藥事法第27-2條必要藥品清單共計398項，廠商若有必要藥品清單之成分、劑型及藥理作用的藥品許可證，且未切結不製造、不輸入者，如有無法繼續製造、輸入或不足供應該藥品之虞時，應依藥事法第27-2條第一項規定，向食藥署通報，以免受罰。

# Gefapixant拮抗P2X2/3受體止咳新藥

◎文／藥學生吳承軒、高雄記者毛志民

全球約有10%至12%的人患有慢性咳嗽，若小孩持續四週以上的咳嗽，成人持續八週以上咳嗽定義為慢性咳嗽。

Gefapixant是非鴉片類、選擇性P2X3及P2X2/3受體拮抗劑，Gefapixant的臨床早期研究中，曾對骨關節疼痛(膝關節)、間質性膀胱炎/膀胱疼痛和哮喘患者進行臨床II期研究，但這些研究都已中斷；再對阻塞性睡眠呼吸暫停進行臨床I期研究，特發性肺纖維化伴頑固性咳嗽和子宮內膜異位疼痛進行了II期研究卻都沒有進展，僅在治療難治性或不明原因之慢性咳嗽有所突破，2022年元月獲得日本藥政單位「醫藥品醫療機器綜合機構」(Pharmaceuticals and Medical Devices Agency, PMDA)核准上市，美國及歐盟藥政單位正新藥審查中。

P2X受體為ATP調控三聚體離子通道(ATP-gated trimeric ion channels)，具有P2X1-7七種亞型；咳嗽由Aδ-fibres及C-fibres組成迷走神經調控，其中C-fibres可以被ATP活化P2X3受體而引發咳嗽。

慢性咳嗽常見共病包括：氣喘、非氣喘性嗜酸性支氣管炎(nonasthmatic eosinophilic bronchitis)、慢性阻塞性肺病、胃食道逆流、大腸激躁症及肥胖等；慢性咳嗽的成因複雜、診斷不易，現行治療多以這些共病著手。然而，就算控制得宜，許多患者卻仍慢性咳嗽不止，國內醫師常以Codeine、Dextromethorphan等藥物治療，但也埋下藥物濫用、呼吸抑制等隱患。

Gefapixant於納入1360位受試者的臨床第三期試驗顯示，相較安慰組可顯著降低24小時咳嗽頻率；合併兩個雙盲研究共計超過2,000名參與者的研究顯示，每天兩次服用Gefapixant 45mg，咳嗽頻率降低了18.5%，然各種族最適劑量的調整仍需要深入探究。由系統性回顧文獻可知常見不良反應有味覺障礙或喪失、頭痛、咳嗽、上呼吸道或泌尿道感染，但統計並

無顯著差異，且停藥後便可緩解，預期此全新機轉止咳藥會是治療慢性咳嗽的新選擇。

(本文藥學生為大仁科技大學藥學系臨床組) 參考資料：

1. Abu-Zaid, A., et al., Safety and efficacy of gefapixant, a novel drug for the treatment of chronic cough: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Ann Thorac Med, 2021. 16(2): p. 127-140.
2. Steven EW, Kai S. Causes and epidemiology of subacute and chronic cough in adults. In: UpToDate, Post TW (Ed), UpToDate, Waltham, MA. (Accessed on October 27, 2022.)
3. Cui, W.W., et al., P2X3-selective mechanism of Gefapixant, a drug candidate for the treatment of refractory chronic cough. Comput Struct Biotechnol J, 2022. 20: p. 1642-1653.
4. Ford, A.P., et al., The discovery and development of gefapixant. Auton Neurosci, 2021. 235: p. 102859.
5. Markham, A., Gefapixant: First Approval. Drugs, 2022. 82(6): p. 691-695.
6. McGarvey, L.P., et al., Efficacy and safety of gefapixant, a P2X3 receptor antagonist, in refractory chronic cough and unexplained chronic cough (COUGH-1 and COUGH-2): results from two double-blind, randomised, parallel-group, placebo-controlled, phase 3 trials. Lancet, 2022. 399(10328): p. 909-923.

7. Morice, A.H., et al., ERS guidelines on the diagnosis and treatment of chronic cough in adults and children. Eur Respir J, 2020. 55(1).
8. Muccino, D. and S. Green, Update on the clinical development of gefapixant, a P2X3 receptor antagonist for the treatment of refractory chronic cough. Pulm Pharmacol Ther, 2019. 56: p. 75-78.
9. Smith, J.A., et al., Improvements in Objective and Subjective Measures of Chronic Cough with Gefapixant: A Pooled Phase 3 Efficacy Analysis of Predefined Subgroups. Lung, 2022.



買5000送300 (特價品不列入計算) 7/5止

端午 放粽一夏

山苦瓜 武靴葉 綜合益生菌 諾麗果酵素

凡活動期間訂購者(不限金額) 即加贈左旋C面膜乙份

木鱉果葉黃素 2000元	山桑子葉黃素錠 1500元
魚油 1100元	藍藻(螺旋藻) 1000元
膠原蛋白膠囊 1700元	甲殼素 1500元
膠原蛋白粉 1500元	寶洛美(神經酸) 4500元
印加果油 2200元	康樂美(大豆異黃酮) 2500元
蜂膠 2000元	優渥玻尿酸 4500元
蜂王乳 4000元	姬汝婷(胎盤) 3000元
頂級山苦瓜 2800元	綠茶粉膠囊 850元
維他命+鐵 2500元	康樂美膠囊 1500元
維他命+鋅 2500元	唐辛子膠囊 1100元
玫瑰四物糖 2500元	蔓越莓膠囊 2000元
金鷹補鐵能 1800元	麗美蝦膠 1800元
五味子芝麻錠 2000元	高單位B群錠 2800元
珍珠貝殼膠錠 1500元	鎂膠母錠(澳洲海母) 1000元
維生素D600IU 1500元	聖潔莓益生菌膠囊 2000元

加價購專區

- 1 護髮時空膠囊(30粒) \$120元
- 2 EGF時空膠囊(30粒) \$349元
- 3 玻尿酸面膜(10片/盒) \$120元
- 4 蜂蜜海藻面膜(10片/盒) \$99元
- 5 黃金緊緻精華(15ml/瓶) \$150元
- 6 葡萄糖胺飲品(1000ml) \$400元

贈 成功加入LINE好友 EGF(時空膠囊)乙份

貝萊登生物科技股份有限公司 全國唯一可少量客製化代工

TEL: 0800-855-059 FAX: (05)285-0121

誠意收購 PIC/S GMP藥廠

意者請備簡介資料→逕寄 (必要時可先簽保密協定)

Email: bigravenkimo@yahoo.com.tw 李經理收

急徵 藥師 年薪75萬以上 (可議)

恆基醫療恆春基督教醫院 財團法人 HENG CHUN CHRISTIAN HOSPITAL

意者請備履歷、證照(影本)逕寄 更多詳細內容請至1111人力銀行

Email: 1600042@hcch.org.tw

地址: 946屏東縣恆春鎮恆西路21號

電話: (08)889-2293 # 386 人資邱主任

高雄市第一藥師公會 公告

112年度中藥委員會臨床實務與實作課程

- 一、課程日期：112年7月30日(週日)
- 二、課程地點：本會自由會館(高雄市鳳山區自由路164號6樓 電話:07-7406465)
- 三、自即日起至112年7月10日止(額滿或逾期截止。不接受電話報名。)

公會報名：臨櫃報名(文衡會館)

公會電話：07-7769876

高雄市藥師公會 公告

112年度「繼續教育20學分第二場-實體+線上課程」

- 一、上課日期：7月9日(週日)、7月30日(週日)，共兩日。
- 二、上課時間：8:30~18:10
- 三、費用：會員免費、非會員1,500元
- 四、學分：專業18積分、法規2積分

# 揮別疫情 嘉縣政府頒獎感謝藥師等有功團隊



↑嘉義縣政府於6月4日舉辦「COVID-19防疫有功單位授獎典禮」，感謝所有相關人員辛勞奉獻

◎文／嘉義縣記者紀珮珊

嘉義縣政府於6月4日舉辦「COVID-19防疫有功單位授獎典禮」，感謝所有相關人員辛勞奉獻，齊心抗疫。

嘉義縣長翁章梁、衛福部次長王必勝、疾管署長莊人祥共同頒發獎盃給有功單位，嘉義

縣衛生局長趙紋華、疾管署南區管制中心主任李翠鳳、立委、議員、醫療單位、藥師團體、醫護團體等近500人出席典禮，一同回顧三年來的防疫點滴，場面盛大而溫馨。

翁章梁致詞表示，防疫作戰就像是一個大團隊，嘉義縣政府、醫院、藥師、藥劑生、醫

師、護理師公會、防疫旅館、防疫計程車等共同結合為重要的大團隊，非常感謝大家辛勞的奉獻，冒著確診的風險，堅守崗位，才能守住嘉義，守護民眾健康。

此次防疫作戰艱辛而困難，許多人在防疫崗位上都有記憶深刻的故事，更感謝站在第一線抗疫的醫護人員與醫療工作者，面對來勢洶洶的疫情，站在工作崗位上，不能有拒絕的理由，只能接受攜手抗疫，無論在工作、家庭與心理層面上都必須承受強大的壓力，面對作戰，只有堅守崗位不退縮，沒有拒絕的權利，「感恩有您！」在嚴峻的疫情下，共同攜手打了一場漂亮的硬仗！

在歡慶感恩中頒獎盃給有功單位，掌聲不斷，典禮中放映著回顧三年多來攜手抗疫的影片，還有合唱團表演與熱舞表演，場面溫馨熱鬧。

# 指示藥不給付與自我用藥照護論壇登場



↑「健保指示藥不給付與民眾自我用藥照護論壇」於6月10日在嘉南藥理大學登場。

◎文／全聯會記者陳進男

由嘉南藥理大學與台灣藥學會政策與法規委員會共同舉辦「健保指示藥不給付與民眾自我用藥照護論壇」於6月10日在嘉南藥理大學登場。副校長錢紀銘主持開幕，會中邀請前藥師公會全聯會理事長古博仁主持，中央健保署簡技連恆榮、博士劉文雄、主任陳昭姿分享，除現場報名與會外，也開放線上直播參與，宣

傳後很快就報名額滿，可見許多藥師均相當關心此議題。

連恆榮分享「指示藥品之健保政策」，介紹指示藥品健保給付的法源依據、給付背景及現況，也對未來政府在精進策略上提出思考方向；劉文雄分享「台灣處方藥轉換指示藥」，以自身在食藥署指示藥品及成藥諮議小組擔任委員的經歷，分享政府在處方藥轉換指示藥的

運作模式及指示藥品審查基準；座談與談人陳昭姿談及目前健保是「小病照顧很好，大病有缺口，政府應該照顧的是重大疾病」、「看完病一定要在醫療院所拿藥的觀念要更正」。

綜合討論過程中，現場及線上藥師也向三位與談人提出相當多問題與討論。目前我國的健保制度下，涵蓋所有的疾病，民眾對小病治療很滿意，因為很方便，但相對而言，也排擠重大疾病的照護。這也是政府必須思考的問題，所有疾病都一定要看病治療嗎？民眾不能透過藥師指示協助自我照護嗎？診所開立所有指示藥品有無必要性？病人真的需要那麼多藥嗎？醫師與民眾中間還有其他醫療專業人員有無善加運用？

另外，有關指示藥的概念不是誰在賺錢，而是醫療需求必要性，通常藥師面對民眾使用指示藥多會提醒「三天症狀沒改善，要趕快就診。」會議主持古博仁在會議中提到「大病到大醫院，小病到診所，小小病自我照護」的觀念，期許政府能推廣讓民眾普及知悉。



2023 FIP Congress

◎文／藥師蘇柏名



The FIP has been founded for more than a century in Hague, Netherlands. The FIP focuses on several key areas of advancement, including academic pharmacy, clinical biology, community pharmacy, health & medicines information, industrial pharmacy, hospital pharmacy, and social & administrative pharmacy.

創立超過一百年的世界藥學會總部位在荷蘭海牙。主要發展重點包含：學術藥學、臨床生物學、社區藥學、健康醫學、工業藥學、醫院藥學、社會藥學與藥事行政等。



academic [ˌækəˈdemɪk]  
學術的



industrial [ɪnˈdʌstriəl]  
工業的



administrative [ədˈmɪnəˌstrətɪv]  
管理的、行政的



## 中藥學堂

### 七則植物類

#### 生藥釋名集解之討論(+)

◎文／藥師林大楨

##### 4. 厚朴(こうぼく):

厚朴的臨床應用，當做健胃、鎮咳、祛痰、鎮痛藥、鎮痙藥等方劑的配合藥。使用在腹部膨滿、便秘、腹痛、消化不良、下痢等。漢方醫學認為厚朴的藥效有：①降氣除滿，例如配合有大承氣湯、半夏厚朴湯、平胃散等。②燥濕化痰，例如配合有神秘湯、柴朴湯、桂枝加厚朴杏仁湯等。厚朴一天的使用量：1~5g左右。<sup>25</sup>而日本的漢方醫學大師吉益東洞曰：「厚朴，主治胸腹脹滿也。旁治腹痛。」「大承氣湯證曰：腹脹滿，又曰：腹中滿痛。厚朴三物湯證曰：痛而閉。厚朴七物湯證曰：腹滿。厚朴生薑甘草半夏人參湯證曰：腹脹滿。以上四方，厚朴皆半斤。」「枳實薤白桂枝湯證曰：胸滿。梔子厚朴湯證曰：腹滿。以上二方，厚朴皆四兩。」「半夏厚朴湯證曰：咽中如有炙臠。以上一方，厚朴三兩。」「小承氣湯證曰：腹大滿，不通。以上一方，厚朴二兩。」右歷觀此諸方，厚朴主治脹滿也，明矣。<sup>26</sup>

##### 5. 杜仲(とちゅう):

載於《本草綱目》卷三十五，木之二，喬木類。<sup>27</sup>(1)於杜仲的〔釋名〕：思仲《別錄》、思仙《本經》、木綿《吳普》、綿。〔時珍曰〕：「昔有杜仲服此得道，因以名之。思仲、思仙，皆由此義。其中皮有銀絲如綿，故曰本綿。其子名逐折，與厚朴子同名。」(2)於杜仲的〔集解〕：①〔別錄曰〕：「杜仲生上虞山谷及上黨、漢中。二月、五月、六月、九月採皮。」②〔弘景曰〕：「上虞在豫州，虞、虢之虞，非會稽上虞縣也。今用出建平、宜都者。狀如厚朴，折之多白絲者為佳。」③〔保昇曰〕：「生深山大谷，所在有之。樹高數丈，葉似辛夷。」④〔頌曰〕：「今出商州、成州、峽州近處大山中。葉亦類柘。其皮折之白絲相連。江南謂之。初生 葉可食，謂之 芽。花、實苦澀，亦堪入藥。木可作屐，益腳。」<sup>27</sup>

現在對杜仲的〔釋名〕、〔集解〕做討論：

(1) 於杜仲的〔釋名〕，①〔名醫別錄〕叫思仲。②〔神農本草經〕叫思仙。③〔吳普本草〕叫木綿。④一般又叫綿。⑤〔李時珍說〕：「以前有一個叫杜仲的人，服食此物得道成仙，因此以他的名字來命名。思仲、思仙都取其義。杜仲皮中有銀絲像綿狀物，所以又叫木綿。杜仲的果實叫逐折，和厚朴的果實同名。」現代已知：杜仲皮中含杜仲膠(gutta-percha)，將杜仲皮折斷會牽銀絲像綿狀物，是杜仲皮的特徵。

(2) 於杜仲的〔集解〕，①〔名醫別錄說〕：「杜仲生長在上虞的山中，及上黨、漢中。二月、五月、六月、九月採它的樹皮。」②〔陶弘景說〕：「上虞位在豫州，是虞、虢的虞，不是會稽的上虞縣。現今使用的杜仲多產於建平、宜都。藥材的性狀類似厚朴，將杜仲藥材折斷有較多的白絲者較好。」③〔韓保昇說〕：「杜仲生長在深山的大谷中，有許多地方都有生長。杜仲樹高數丈，其葉片像辛夷。」④〔蘇頌說〕：「杜仲現今產於商州(註：商州為現在陝西商縣)、成州(成州為現今的甘肅成縣)、峽州(峽州為現今的湖北宜昌縣)之近處的大山中。杜仲的葉和柘樹葉類似。」柘樹是桑科(Moraceae)植物，柘樹其學名*Cudrania tricuspidata* (Carr.) Corner，又叫做柘桑，是落葉灌木，幹直，葉可養蠶，根皮入藥，當做強壯劑。蘇頌又說：「杜仲的樹皮折斷時，有白絲相連。在江南叫做。杜仲的初生嫩葉可食用，叫做 芽。杜仲的花、果實苦澀，也可入藥。杜仲的木材可以做成拖鞋，對腳有好處。」

參考文獻：

- 25《漢方·中醫學講座~臨床生藥學編》：入江祥史監修·執筆。牧野利明編集·執筆。日本東京醫齒藥出版株式會社發行。第253頁。
- 26《藥徵全書·敦煌石室古本草合訂本》：吉益東洞、孟詵著。新文豐出版股份有限公司發行。《藥徵》第96頁。
- 27《本草綱目》：明·李時珍著。中國醫藥研究所出版(台北市)。第1136頁。

(待續)

(本文作者為日本私立第一藥科大學藥學士、日本國立九州大學藥學博士。藥師、教授、研究所所長退休。)

## 臨床藥學大觀園

《御藥之道》

### 合併使用 Topiramate 和 Valproic Acid

#### 可能增加高血氨症風險

(下)

◎文／王明業

多項研究觀察到VPA與TPM，無論是單獨使用或者併用，都有可能增加高血氨症的風險。個案報告中，即使患者未伴隨任何肝臟或腎臟疾病，高血氨性腦病變仍可能在用藥過程中快速發展。一項以VPA單方治療或VPA與TPM組合治療的患者為對象之韓國研究發現，11位(0.13%)使用VPA後引起腦病變的病人中，有7位是併用VPA與TPM組合療法的患者。比起VPA單方治療，VPA與TPM組合療法之腦病變勝算比(odds ratio)高達10.16，具有非常顯著的正相關性。VPA相關腦病變的盛行率僅約0.1%，但儘管少見，合併TPM和VPA仍使其風險大幅提升。

醫療專業人員對此嚴重副作用應有所警覺，高血氨性腦病變與VPA劑量、血中濃度和治療時間沒有明顯關聯，更加仰賴醫療人員的臨床觀察。給予VPA與TPM前建議先行檢測血氨濃度，並以每2週最多增加25 mg的速度逐步調升TPM的治療劑量。VPA與TPM併用期間，須監測病患的藥物血中濃度、血氨濃度和臨床表現，在懷疑有腦病變、肝功能異常或失溫症時考慮停用藥物；若癲癇控制良好，也應考慮調降VPA的劑量，維持療效的同時避免腦病變，確保病患的用藥安全。

參考資料：

- 1.Noh Y, Kim DW, Chu K, et al. Topiramate increases the risk of valproic acid-induced encephalopathy. *Epilepsia* 2013;54:e1-4.
- 2.Latour P, Biraben A, Polard E, et al. Drug induced encephalopathy in six epileptic patients: topiramate? valproate? or both? *Hum Psychopharmacol Clin Exp* 2004;19:193-203.

(全文完)

(本文作者為臺北榮民總醫院藥學部  
臨床藥師 / 陽明大學藥理所  
臨床藥學組碩士)

# 大樹藥局

今周刊發表 台灣百大上市櫃生技公司

## 徵藥師

醒師專案  
開店創業



教你開一家會賺錢的店

分紅入股當股東，創業加盟當店東



2023-2024年  
創業輔導現正  
募集中

誠摯  
邀請

第5個五年計劃 • 200位藥師店東  
報名人數已達140位，尚餘60位名額 等您來加入

帶薪受訓，開店前收入不中斷 | 報到後最快六個月可開店

開店第一年就獲利達 **100%**

加盟店東-獲利統計

統計區間：2021年度

每月淨利	15-25萬	25-35萬	35-45萬	45萬以上
店數占比	30%	20%	27%	23%

快來卡位

我要報名

+1

24小時內  
將有專人回覆

我也想要報名

履歷免投人力銀行，手機掃QR code線上填資料，服務專線：0986-685-408 (同LINE-id)加LINE留言

集眾之智·創眾之制·集眾之力·創眾之利



Learn. Connect. Explore.

## FAPA 2023 亞洲唯一藥學盛事

HEALTH SYSTEMS RESILIENCE, SECURITY AND EQUITY:  
PHARMACISTS CAN HELP

3,000名國內外產官學  
藥學專家齊聚一堂

# 盛大報名&徵稿中!!!

活動報名連結



線上投稿連結



年會主題

「後疫情時代，公共衛生體系的韌性、安全與社會公平：藥師攜手相挺」

HEALTH SYSTEMS RESILIENCE, SECURITY AND EQUITY: PHARMACISTS CAN HELP

10/24(TUE)~10/28(SAT)

台灣·台北·

TICC台北國際會議中心

主辦單位:



### 專屬女性的 口服避孕藥

**愛己服衣錠** 愛利藥廠字號 027007 號

**愛荷服衣錠** 愛利藥廠字號 027226 號

愛己服衣錠：每盒裝有28片，含21片有效成分。每日服用一粒，可預防懷孕及避免不想要的懷孕。服用時請依照說明書上的指示，每天服用一粒，可預防懷孕及避免不想要的懷孕。服用時請依照說明書上的指示，每天服用一粒，可預防懷孕及避免不想要的懷孕。

愛荷服衣錠：每盒裝有28片，含21片有效成分。每日服用一粒，可預防懷孕及避免不想要的懷孕。服用時請依照說明書上的指示，每天服用一粒，可預防懷孕及避免不想要的懷孕。服用時請依照說明書上的指示，每天服用一粒，可預防懷孕及避免不想要的懷孕。

Lotus 培力藥品 PeiLi Pharm

### Saforelle 絲膚潔

所有私密問題，一瓶搞定

私密沐浴露 私密沐浴泡泡

法國原裝進口

法國私密護理領導品牌  
〈全球婦產科醫生推薦〉

賴昕隄 · 醫師推薦

Laboratoires IPRAD | 培力藥品 PeiLi Pharm

培力藥品 TEL:04-23592576 | www.saforelle.com.tw  
培力藥品 PeiLi Pharm 台中市西屯區工業區六路11號

### Diclac (1% diclofenac sodium) 痛立停 酸痛凝膠

德國原裝進口 迅速消除疼痛

消除疼痛 提升吸收力

因為有微脂囊Liposome，外層結構類似細胞膜，能夠在極短時間內滲入皮膚表皮細胞。

外層有所保護，增加了整體的吸收，更精準達到治療目標，提高臨床療效。

磷脂質 Phospholipid 親水端 Hydrophilic Head 疏水端 Hydrophobic Tail 有效主成分 Active Ingredient 微脂囊 Liposome

諾華集團出品

德可立爾 40毫克 膜衣錠

緩解腦部損傷 促進血液循環

末梢血行障礙的輔助治療 適用血管病變的糖尿病人

德可立爾 40毫克膜衣錠 Coryol 40mg Film-coated Tablets

【成分】每錠膜衣錠有效成分含量：鎮痛藥羧酸類Coryol (Diclofenac) 40毫克。【適應症】末梢血行障礙之輔助治療。【用法用量】18歲以上，每次1錠，早、中、晚各一錠。有下列情形者，請勿服用。1. 對Diclofenac Sodium, Acetylsalicylic acid及其他非類固醇消炎藥過敏者。2. 對Proylene glycol有過敏反應者禁用本藥。3. 懷孕第三期禁用本藥。4. 本藥只能用於完整皮膚，不可用於裂傷的皮膚或開放性傷口。5. 不要與酒精及熱飲液體、僅供外用。6. 其他詳細注意事項與副作用請詳閱藥品說明書。

培力藥品 PeiLi Pharm

### 末梢血行障礙 之輔助治療 選擇

德國原裝進口

諾華集團出品

德可立爾 40毫克 膜衣錠

緩解腦部損傷 促進血液循環

末梢血行障礙的輔助治療 適用血管病變的糖尿病人

德可立爾 40毫克膜衣錠 Coryol 40mg Film-coated Tablets

【成分】每錠膜衣錠有效成分含量：鎮痛藥羧酸類Coryol (Diclofenac) 40毫克。【適應症】末梢血行障礙之輔助治療。【用法用量】18歲以上，每次1錠，早、中、晚各一錠。有下列情形者，請勿服用。1. 對Diclofenac Sodium, Acetylsalicylic acid及其他非類固醇消炎藥過敏者。2. 對Proylene glycol有過敏反應者禁用本藥。3. 懷孕第三期禁用本藥。4. 本藥只能用於完整皮膚，不可用於裂傷的皮膚或開放性傷口。5. 不要與酒精及熱飲液體、僅供外用。6. 其他詳細注意事項與副作用請詳閱藥品說明書。

培力藥品 PeiLi Pharm